



Suporte clínico 24 horas: **1.888.413.3104**

Nos Estados Unidos, o Sistema EZ-IO® possui indicação para extensão da utilização por 48 horas em determinadas circunstâncias. Essa indicação ampliada não está disponível em todos os países da América Latina. Para obter mais informações sobre sua jurisdição específica, entre em contato com o representante local de Assuntos Regulatórios.

¹Leidel BA, Kirchhoff C, Bogner V, Braunstein V, Biberthaler P, Kanz K-G. Comparison of intraosseous versus central venous vascular access in adults under resuscitation in the emergency department with inaccessible peripheral veins. Resuscitation. 2012;83(1):40-45.

Este material não tem por objetivo substituir a formação clínica padrão e o treinamento da Teleflex Incorporated, e deve ser utilizado como complemento para informações mais detalhadas disponíveis sobre o uso adequado do produto. Veja os recursos educacionais em Teleflex.com ou entre em contato com um profissional clínico da Teleflex com quaisquer perguntas detalhadas relacionadas à inserção, manutenção, remoção do produto e outras informações de educação clínica.

A Teleflex isenta-se de qualquer responsabilidade pelo uso, aplicação ou interpretação do uso dessas informações no tratamento médico de qualquer paciente. Qualquer profissional de saúde que use este material assume total responsabilidade pelos cuidados médicos e tratamento de seus pacientes.

Teleflex, o logotipo da Teleflex, Arrow e EZ-IO são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Teleflex e de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todos os direitos reservados. ©2020 Teleflex Incorporated. MC-0006647 REV 1 LA PTBR